

SMERNICE ZA POSTUPANJE PRI LEČENJU

MEDICINSKE INFORMACIJE U HITNIM SLUČAJEVIMA



KONTAKTI U HITNIM SLUČAJEVIMA

Frederick S. Kaplan, M.D.

991 (215) 349-8726/8727 (kancelarija)

991 (215) 545-0758 (kuća)

Frederick.Kaplan@uphs.upenn.edu

Robert J. Pignolo, M.D.

991 (215) 349-8726/8727 (kancelarija)

991 (215) 308-9643 (pejdžer)

Pignolo@mail.med.upenn.edu

Eileen Shore, Ph.D.

991 (215) 898-2331 (kancelarija)

991 (215) 628-8211 (kuća)

991 (215) 898-8653 (FOP Laboratorija)

Shore@mail.med.upenn.edu

IFOPA kancelarija

991 (407) 365-4194

Together@ifopa.org



KAKO POSTUPITI PRI LEČENJU

Trauma (uključujući intramuskularne injekcije) **negativno utiče na FOP** zbog čega sa pacijentom treba nežno postupati i srečavati bilo kakav pad ili udarac. Procenite koliko je slučaj hitan i zaštitite život pacijenta kao da nije u pitanju FOP. FOP sam po sebi retko može prouzrokovati hitan slučaj.

MOLIMO, uvek pratite smernice za hitne slučajeve, a ako ima vremena, strogo se preporučuju konsultacije sa doktorima ekspertima zbog potencijalnih rizika koje može uzrokovati bilo koja hiruška ili medicinska intervencija.

- 1.) Izbegavati traume dubokog tkiva:** uključujući intramuskularne injekcije, ako je moguće
- 2.) Stabilizovati i tretirati:** NIKAKO ne koristiti intramuskularne injekcije, ali intrakutni, supkutani i intravenozni lekovi su u redu
- 3.) Preduzeti mere predostrožnosti pri intubaciji:** zaštititi vilicu i zatražiti stručnu pomoć pri davanju anestezije s obzirom da vilica i vrat mogu biti potpuno ili delimično ukočeni
- 4.) Konsultacije sa doktorima ekspertima** se strogo preporučuju zbog potencijalnog rizika koji nosi svaka hiruška ili medicinska intervencija.

ŠTA JE FOP?

Osoba sa ovom karticom ima dijagnozu Fibrodysplasia Ossificans Pogrressiva (FOP), retko genetsko oboljenje kod koga se mišići, ligamenti i ostalo vezivno tkivo pretvaraju u kost. Zglobovi postaju ukočeni i trajno nepokretni.

POTREBNI UZORCI TKIVA

Uzorci tkiva dobijeni u hitnim slučajevima ili tokom operacija su neprocenjivi za istraživanje. Ako osoba sa FOP-om mora da bude podvrgnuta takvoj intervenciji, tkivo se može uzeti bez dodatnog rizika. Prilikom uzimanja tkiva mogu predstavljati čak i posekotine kojima treba ušivanje ili kojima je oštećeno duboko tkivo. Pozovite nekog od doktora eksperta (Dr Shore, Kaplan ili Pignolo) da biste dobili instrukcije kako uzeti uzorak tkiva. Ako nema vremena da obavite telefonski razgovor: **1) Iseckati uzorak** na komadiće ne veće od nokta; **2) Staviti ih** direktno u označenu sterilnu epruvetu sa sterilnim slanim rastvorom; **3) Zapečatiti epruvetu** dobro da ne curi; **4) Upakovati** tako da se ne polomi tokom transporta; **5) Poslati** je na sobnoj temperaturi brzom poštom na adresu: *Drs Kaplan and Shore, Univ. of Pennsylvania, Ortho. Dept., 424 Stemmler Hall, 36th and Hamilton Walk, Philadelphia, PA 19104-6081*; **6) Obavestiti doktore** da je uzorak tkiva poslat sa detaljima, npr. pacijent, vrsta tkiva.